

P. C. Fabricius  
De  
Animalibus Wett-  
raviae insigens.

449

137

ex libris



Donald Mac  
Gillavry



CHAVV

PHILIPPI CONRADI FABRICII

MED. D. ET P. P. O. HELMSTADENSIS,

COMMENTATIO

HISTORICO-PHYSCO-MEDICA

DE

ANIMALIBVS

QVADRVPEDIBVS,

AVIBVS, AMPHIBIIS, PISCIBVS ET

INSECTIS WETTERAVIAE

INDIGENIS.



HELMSTADT 1749.

LITTERIS PAULI DIETERICI SCHNORRII,

ACAD. TYPOGR.

## SENECA.

Multa egerunt qui ante nos fuerunt, sed non per-  
egerunt, multum adhuc restat operis multumque  
restabit, nec ulli nato post mille saecula praeclu-  
detur occasio aliquid adhuc adiciendi.



## PRAEFATIO.

**E**A inter scientiarum curatius excultarum genera, quibus saeculum nostrum iure suo prae saeculis antecedentibus gloriari potest, Historia rerum naturalium triplici mineralis, vegetabilis animalisque regni titulo comprehensarum haud dubie partes prioribus proximas occupat. Huius enim tantae hoc nostro, quo vivimus, aevo ampliationes a viris harum rerum curiosis effectae fuerunt, ut quod de vrbe Roma tunc temporis orbis Dominatrice AVGVSTVS primus eius Induperator constantioris fortunae quondam adfir-

mauit, se, quam lateritiam reperisset, marmoream relinquere, haud pauci ex illis de suis in nobilissimum hoc studium meritis sine vanitatis nota itidem dicere queant. Vt enim nihil de herbarum doctrina nostra tempestate ad rerum fere culmen tot praestantissimorum virorum alibi ex parte a me celebratorum coniuncta opera promota iam commemorarem; ne quid etiam de Mineralogia referam, utpote quod doctrinae genus, nunc longe alia eaque nitidiore facie quoque splendet, quam saeculis elapsis conspiciebatur; Historia animalium tum maiorum & ad sensum perfectiorum tum minorum seu insectorum & vermium & pro imperfectioribus vulgo habitorum, quorum pristino tempore non nisi confusa & quam maxime hiulca notitia prostabat, hodie tot praestantissimorum Naturae Mystrarum ALBINI, ARTEDI, BARRIERII, BREYNII, CATESBYI, DERHAMI, FISCHERI, GEERII, IVSSIAEI, KLEINII, LESSERI, LINCKII, LINNAEI, MARSILII, MERIANAE, RAII, NANNI, REAVMVRII, SEBAE, VALLISNERII, ZOENII, SCHWAMERDAMII, ROESELII, ZINNANI, aliorumque concatenatis laboribus non minus superbo

bo habitu & methodica digestionem, quam Botanice harum deliciarum cupidos & capaces ad se allicit. Perpendenti itaque mihi, quod si cuius homini ratione praedito vel ex sola lege Naturae incumbat non intra generalia Physices dogmata subsistere, sed rerum naturalium quam amplissimam simulque curatam notitiam sibi comparare, ac eam tum ad propriam voluptatem commodaque, tum ad usum aliorum, tum etiam ad perfectiones & gloriam summi huius universi Auctoris quam maxime evidenter inde cognoscendas & cum aliis communicandas impendere; eo maiore iure hoc ob insignem illarum rerum in sanitatem hominum effectum ab eo requiri queat, qui Medici nomen & munia rite explere cupit, statim desiderium huic quoque doctrinae generi, aliquam studii mei & operae partem dicandi enatum fuit. Quum itaque zoologiae, post herbas culturam regionis, in qua tunc vivebam, conditio solam admitteret; ductum supra laudatorum huius Scientiae Antistitem sequendo in perquisitione plantarum Patrii soli per plurium annorum spatium quondam instituta ad animalia

cum maiora tum minora in eodem occurrentia simul oculos mentemque semper intendi, observationesque collectas cum placitis horum Auctorum conferendo denique deprehendi, non minus curiosa, sed ad cultum maiorem Historiae naturalis aequae facientia, quam in regno herbarum hic occurrere. Istarum observationum nonnulla momenta, ne interciderent, hoc igitur Schediasmate cum benevolo LECTORE communicanda duxi, ulteriores huius thematis tractationem horis subsociis in posterum in animantium specibus hic loci mihi obuiis quoque non plane intermissurus.

Equidem diuersa erant, quae animi miranda Naturae cognoscendi audum ab harum rerum perscrutatione initio aliquo modo deterrebant. Non solum enim praeter plura elegantiora reliqua quoque animalia primo intuitu satis foeda & sanitati humanae multum detrimenti minantia propius considerari oportebat, sed etiam istud studii genus, praecipue quod ad insecta refert, nondum adeo excultum & ad talem perfectionis gradum perductum deprehendebam,



bam, ut in sanando homine, ad quem scopum Medico in omnibus, quae suscipit, negotiis semper maxime respiciendum persuasus eram, si pauca quaedam, sed illa excellentissima \*) tamen, excipias, insignem usum praestare adhucdum posse videretur.

Singula tamen haec obstacula statim maximam partem collabebantur quum simul perpenderem, hic aequè ut in Astronomia, Botanice & rerum subterranearum doctrina aliisque scientiis experientia nitentibus factum est, res semper prius numero comprehendendas & ope certorum characterum a facie earum externa desumptorum in Systema quoddam redigendas esse, antequam de earum Natura & in salutem hominum efficacia aliquid solidi tradi queat. Praeterea vero plerasque etiam

A 4

e mi-

---

\*) V. gr. millepedes asthmaticis & hydropicis; lumbrici terrestres arthriticis; cancri fluviatiles & cochleæ phthysicis hecticisque; & conchæ febricitantibus præstantissimum auxilium adferunt, ut de formicarum, cantharidum hiru-  
dinumue usu externo iam nihil proferam, utpote quarum in pluribus morbis efficaciam nemo pariter ignorat.

e minutissimis hisce bestiolis tam insigni organorum artificio compositas videbam & innumera sua figurae, structurae & coloris membraque movendi rationis varietate sensus meos tanta cum voluptate percellentes, vt alias res naturales & ipsam adeo Botanologiam & Mineralogiam, quae posterior conditione organica carens sola fere colorum & mixturae corporum naturalium diversitate oculos nostros pascit, intellectu maximam partem otioso relicto, & facilitate tractationis & nobilitate copiaque idearum multis parasangis post se relinquerent. Quumque insuper comprehenderem, animalium maiorum, quadrupedum, piscium, aviumque nempe exquisitam & autopticam notitiam Medico, sicuti in tractatione materiae Medicae in vniuersum, ita in Diaeteticis praesertim aliquid solidi praestare cupienti adeo absolute necessariam esse, ut sine ea, quae magni illi & celeberrimi in hoc studii genere viri BRUYERVS NONIVS & SEBIZIVS de hac re tum ex veterum monumentis, tum ex sua observatione commentati fuerunt, minime rite intelligi & in artis vsum deduci queant, ad

te-

etiam susceptam pertexendam eo magis  
extinctus fui.

Sperabam quoque, fore ut quem-  
admodum Studium rei herbariae prae-  
cipuam hodierni sui splendoris partem  
Catalogis plantas vni alterius regioni  
propriis continentibus debet, quorum  
Auctores nimia rerum perscrutandarum  
mole haud obruti singula curatius exa-  
minare & determinare valuerunt, &  
quas plantas vna cum observationibus  
in eis institutis deinde cum herbis alia-  
rum regionum eadem vel diuersa eleua-  
tione poli gaudentium comparare aliis  
licet; ita ad Historiam animalium vni-  
uersalem & Methodum eorum natura-  
lem aliquando perficiendam genera &  
species illorum in hoc Schediasmate a  
me recensitae aliquam quoque symbo-  
lam eo certius conferant, quo minor  
hucusque eorum Scientiae Naturae  
Scriptorum in Germania nostra nume-  
rus existit, qui hanc pulcerrimam illius  
partem sibi ex professo, vt aiunt, & in  
forma Systematis excolendam sumserunt.  
Praecipue quum haec animalia, mini-  
mum quod ad quadrupedia, aues & in-  
secta spectat, vni solo natali minus quam

herbae adstricta sint, sed ad plurimum miliarium spatium longe lateque diuagentur, adeoque a cuiusvis provinciae curiosis facili negotio vbique indagari & reperiri queant.

Quod ad ordinem generaliore animalium maiorum aequae ac minorum in hac lucubratione a me recensitorum spectat, in ea normam Systematis Naturae Linnaeani secutus sum, tum quod eius methodum Zoologicam, prout in omnium postrema huius libri editione perpolita & a priori valde diuersa conspicitur, a perfectione nunc longe propius quam Botanicam methodum in eodem libro de nouo propositam abesse credam, tum quod alia praestantior in hoc studiorum genere haud suppetat. In generibus inferioribus tamen praecipue in insectis & speciebus eorum describendis & collocandis ad methodum naturalem & conuenientiam externam harum bestiolarum potissimum respexi, adeoque a placitis Linnaeanis illam sicuti in herbis, ita hic quoque saepe nimis negligentibus subinde recessi, praecipue cum ob Climatis notabilem differentiam mihi necessario vna & altera species noua occurrere debuerit.

CLAS-

33 ) II ( 33  
C L A S S I S I.  
D E

QVADRVPEDIBVS.

Ordo 2. FERARVM dentibus primoribus  
vtrinque 6. caninis longioribus.

*Felis* cauda elongata auribus aequalibus  
*Linnaei* tam domesticus quam ferus.

*Mustela* fuluo nigricans gula pallida L. seu  
Martes eaque vel saxatilis, vel Fagina, vel  
abietina.

*Mustela* flauescente nigricans ore albo col-  
lari flauescente L. seu Putorius.

*Mustela* caudae apice atro L. hieme can-  
dicans.

*Lutra* digitis aequalibus L.

*Canis* cauda recurva L.

a. domesticus L.

b. sagax L.

c. Graius L.

e. aquaticus L.

f. melitaeus L.

g. Aegyptiacus L.

h. Fricatrix L.

i. Mustelinus L.

*Canis*

*Canis* cauda incurva L. seu *Lupus*.

*Canis* cauda recta extremitate alba *Gmelini*  
& L. seu *Vulpes vulgaris*.

*Meles* unguibus anticis longissimis L. seu  
*Taxus* isque vel caninus vel suillus.

*Erinaceus* caninus  
suillus.

*Talpa* caudata L.

*Vespertilio* caudatus ore nasoque simplice L.

#### Ordo 4. GLIRIVM dentibus primoribus 2. prominentibus.

*Sciurus* palmis saliens L.

*Lepus* cauda abrupta pupillis atris L.

*Lepus* cauda abrupta pupillis rubris L. seu  
Cuniculus.

*Ratta* aquatica L.

*Mus* cauda abrupta palmis tetradactylis plantis tridactylis L.

*Mus* cauda longa subnuda corpore fusco cinerascente L.

*Mus* cauda breui corpore nigro fusco abdomine cinerascente L.

*Mus* cauda nudiuscula corpore cinereo fusco abdomine subalbescente L.

*Mus* cauda longa pilosa corpore ruffo, gula albicante L.

*Cri.*

*Cricetus Raii.*

*Mus araneus* L.

Ordo 5. IVMENTORVM dentibus  
anomalis a reliquis

1. 2. 3. 4. 6. diversis.

*Equus* cauda vndique setosa L.

*Afinus* L.

*Mulus Raii.*

*Sus* dorso antice setosa cauda pilosa L. isque  
domesticus vel ferus.

Ordo 6. PECORVM dentibus primoribus  
superioribus nullis inferioribus VI. aut  
VIII. pedibus ungulatis mammis  
inguinalibus.

*Cervus* cornibus ramosis teretibus incurvis  
L. cuius praeter vulgarem diversae aliae  
occurrunt species vel varietates potius,  
e. gr. cervus pinetorum incola; cervus  
candidus.

*Capreolus* L.

*Caper* L.

*Ovis* cornibus compressis lunatis L.

*Bos* cornibus teretibus flexis L.

*Bos* cornibus destitutus.

*Bos* pilis crispis.

CLAS-

## Ordo I. ACCIPITRUM rostro uncinato.

*Bubo primus* L.*Bubo capite aurito pennis* 6. L.*Bubo oculis peniis exstantibus crispis circinatis.**Vlula domestica & saxatilis.**Aquila Valeria Valentini.**Gyro-Falco Eiusdem.**Milvus* L.*Milvus colore saturatione cauda breui.**Nisus vulgaris.**Nisus maxillis albis.**Dendro-Falco* L.*Tinnunculus* L.*Lanio* L. System. Natur. edit. penult.

maior.

medius.

minor.

Ordo PICARUM rostro conuexo  
compresso.*Corvus maximus cadaverum.**Corvus vulgaris**Cornix cinerea* L.



*Monedula* L.

*Pica caudata* L.

*Pica glandaria* L.

*Eadem* longe elegantior.

*Caryocatactes* L.

*Picus niger* L.

*Picus viridis* L.

*Picus varius* L.

maior.

medius.

minor.

*Torquilla* L.

*Cuculus* L.

*Vpupa vulgaris* variegata a)

*Certhia* seu *Reptatrix* L.

Ordo 3. ANSERVM rostro aut fauce  
dentato - serrata pedibus  
natatoriis.

*Cygnus* L.

*Anser* cygneus, qui vero cum anserem cygneo  
elegantissimo apud illustrissimum MAR-  
SILIVM in Opere Danubiali splendidissi-  
mo illo depicto haud confundendus,  
hic noster enim a vulgari non nisi statura  
differt.

*Anser*

---

a) Sine causa nomen huius avis omnibus nota  
cel. LINNAEVS in Epops mutavit, id quod  
in plurium animalium nominibus ab illo fa-  
ctum fuit.

*Anser vulgaris* L.

*Anser ferinus*.

*Anas fera*

*Anas fluviatilis*.

*Mergus fuscus* L.

*Grus* L.

*Ardea cinerea cristata* L.

*Ardea stellaris* L.

*Ciconia vulgaris candida alis nigris*.

*Pica marina*.

*Crex* L.

*Gallinago silvestris*.

*Gallinago palustris*.

*Gallinago capillaris*.

*Vanellus* L.

*Gallinulae* L. diuersae species.

Ordo 5. GALLINARVM rostro conico  
incuruo maxilla superiore  
imbricata.

*Tarda* L.

*Pauo cauda longa* L.

*Gallo-Pauo* L.

*Gallus gallinaceus* L. cuius variae occurrunt  
species v. gr. *Gallus gallinaceus minor*  
*pedibus plumosis*, *Gallus gallinaceus*  
*pennis crispis*, *Gallus gallinaceus statura*  
*maxima*, *Gallus gallinaceus cauda de-*  
*stitutus*.

*Pha-*

*Phasianus* L.  
*Vrogallus* L.  
*Bonasia* L.  
*Perdrix* L.  
*Coturnix* L.

Ordo 6. PASSERVM rostro conico  
 attenuato.

*Oenas* L.  
*Columba domestica* L. cuius itidem plures  
 varietates occurrunt.  
*Palumbus* L.  
*Turtur* L.  
*Oriolus flauus* alis extremaque cauda nigris  
 pupillis rubris *Gesneri* & L.  
*Merula nigra* L.  
*Merula montana* L.  
*Turdus visciuorus* L.  
*Turdus pilaris* L.  
*Turdus iliacus*.  
*Sturnus* L.  
*Sturnus candidus*.  
*Alauda campestris*.  
*Alauda ericetorum* & arborum.  
*Alauda noualium* *Frischii*.  
*Picus cinereus* L.  
*Garrulus Bohemicus* L.  
*Coccothraustes* L.  
*Cucui rostra* L.

*Pyrrhula* L.  
*Fringilla* L.  
*Montifringilla* L.  
*Carduelis vulgaris* L.  
*Spinus* L.  
*Canaria* L.  
*Linaria vulgaris*.  
*Passer domesticus vulgaris*.  
*Passer domesticus candidus*.  
*Passer torquatus*.  
*Citrinella* L.  
*Emberiza* L.  
*Motacilla vulgaris alba*.  
*Merula aquatica* L.  
*Oenanthe* L. maior & minor.  
*Luscinia* L.  
*Rubecula*.  
*Ruticilla domestica & hortensis*.  
*Ficedula macula capitis nigra*. b)  
*Curruca vulgaris*.  
*Curruca cantu Lusciniae Frischii*.

Cur-

- 
- b) Hanc esse avem illam, quae vuis sicubusqu,  
 pasta apud Romanos olim ita in deliciis erate  
 ut teste A. GELLIO a Ludouico NONNIO  
 de re cibaria Libri II. Cap. XXX. citato nega-  
 rent vllam praeter eam integram comedi o-  
 portare, praeter alia ex eo quoque manife-  
 stum fit, quod illa vuis omnium maxime de-  
 lectetur & hinc in regionibus, vbi vitis colitur,  
 frequentior quam alibi occurrat: est vero si-  
 mul atis muscas appetens, adeoque hodie nul-  
 lus amplius palato aridet.

*Curruca subfusca Frischii.*

*Regulus L.*

*Parus maior L.*

*Parus cristatus L.*

*Parus coeruleus L.*

*Parus ater L.*

*Parus palustris L.*

*Parus caudatus L.*

*Hirundo domestica L.*

*Hirundo apus L.*

*Hirundo riparia L.*

*Caprimulgus L.*

## CLASSIS III.

DE

## AMPHIBIIS.

Ordo I. SERPENTVM pedibus nullis.

*Caecilia L.*

*Boa.*

*Natrix.*

Ordo 2. REPTILIVM pedibus 4.

*Lacerta dumetorum.*

*Lacerta minor aquatica.*

*Rana vulgaris lacustris seu Rana palmis tetradactylis fissis plantis hexadactylis palmatis pollice longiore. L.*

*Rana arborea viridis.* c)

*Bufo vulgaris.*

CLAS-

- c) Ranarum ex ovo in pisciculum, & ex hoc in animal quadrupes caudatum & denique in ranam perfectam transformationem seu potius evolutionem SCHWAMERDAMIVS in *Bibliis naturae* omnium optime & Naturae convenienter descripsit. Opinio vero celeberrimi SEBAE in praestantissimo illo *rerum Naturalium Thesauro* publicata, de ranarum in pisces & piscium in ranas retrograda mutatione in ranis Americanis vera esse potest, in exemplaribus ranarum mihi obuiis autem nunquam confirmata fuit. Illis enim in locis, ubi initio aestatis foeturam ranarum parvis punctis nigris innumeris refertam vidi, breui post pisciculi illi globosi, caudati, aurei hinc inde coloris, digitis paulo durius tractati sugillationem statim patientes conspiciebantur, per quorum abdominis cutem intestina gytorum in forma transparebant. Post aliquot septimanas 4. pedibus instructae nonnullae harum bestiolarum ibidem videbantur, denique inuolucro communi disrupto & deposito, omnes pedibus donatae erant simulque caudae conspicuae; ultimo caudis depositis ranae perfectae comparebant, sine ulteriori metamorphosi ad consuetam molem sensim excrecentes, nec numerum piscium odinariorum in piscinis vinquam augentes. Interea negari minime potest, quod foetura ranarum earumque mutatio valde inaequali ratione etiam in una eademque

33 ) 21 ( 33  
 CLASSIS IV.  
 DE  
 PISCIBVS.

*Mustela*  
*Gobius*  
*Perca*  
*Barbus*  
*Carpio*  
*Nasus.*  
*Alburnus*  
*Salmo*  
*Trutta*

B 3

*Fun-*

---

que regione accidat & in autumnum vel initium hiemis usque saepe protrahatur, prout in nonnullis fossis initio Octobris mensis adhuc bestiolae tales apodes a me conspiciebantur, quum in reliquis fossis negotium evolutionis medio aestatis iam absolutum fuisset. Quin imo in quibusdam fossis aestate adultiore iterum de nouo tales pisciculi saepe comparent, in quibus tamen ante aliquot septimanas omnes bestiolae quadrupedes & cauda instructae in perfectas ranas iam tum mutatae videbantur. Id quod tamen hypothesei clarissimae obinde nullum pondus addere potest, quia pisciculi illi ferotini longe minores sunt, quam bestiolae illae quadrupedes antea reperiae, sed nouae geniturae post priorem fossis illis a ranis inmissae adscribendum videtur.

*Fundulus*  
*Thymallus*  
*Lucius*  
*Anguilla* &c.

CLASSIS V.  
 DE  
 INSECTIS.

Ordo I. COLEOPTERORVM elytris  
 alas tegentibus, ore maxillis  
 transuersis.

*Scarabæus* Lucanus L.

*Nasicornis* L.

*Viridulus* L. & vulgaris.

*Viridulus* magnus & speciosus nigricans, elytris molli-  
 bus.

*Viridulus* minor, elytris duris striatis.

*Viridulus* pusillus niger.

*Viridulus* niger magnitudine vulgari subrotundus.

*Viridulus* niger porosus brevis, oculis protuberantibus.

*Viridulus* pusillus niger, elytris luteis maculis signatis.

*Viridulus* melanocyaneus ore albo circulo incluso.



*Pilularius vulgaris* & L. d)

*Pilularius* obsolete niger, elytris variegatis, antennis fissilibus.

*Pilularius minor*, elytris striatis & aequae ac antennis rubris.

*Pilularius minor* ex cinereo & bruneo variegatus.

*Pilularius niger* & parvus.

*Pilularius pusillus niger*, elytris striatis & porosis.

*Pilularius rapax* Gyrini aquatici forma, elytris sanguineo colore maculatis breuibus, antennis medio fractis, forficulis prominentibus.

*Idem* totus niger.

*Scarabaeus Maialis vulgaris* corpore caudato. c)

*Idem minor* & serotinus cauda carens ex viridi nigro bruneoque varius.

*Scarabaeus parvus planus* ex nigro & luteo bruneo variegatus.

*Scarabaeus viriduli vulgaris* magnitudine, colore e viridi cupreo, poris undique refertus

d) Omnes *Pilularii* habent articulos superiores pedum anteriorum serratos, adeoque ad quod genus pertineant, primo intuitu statim indicant.

e) Hic *Scarabaeus* in usu artis Medicae saepe confunditur cum *Proscarabaeo* infra recensendo, quo vero in morfu canis rabidi sarrando longe inferior viribus est.

fertus, antennis 2. tantum instructus ordinariis aequaliter granulatis, in pectore instar Scarabaci Maialis speculum gerens.

*Scarabaeus arboreus striatus* pulvere viridi aureo adpersus, ore nullis forficulis ad sensum instructo, antennis in medio fractis.

*Idem auellanae* magnitudine variegatus.

*Scarabaeus longus & angustus* dilute rubens, elytris *mollibus* nigris, antennis longis instar herbae Salicorniae geniculatis.

*Scarabaeus planus angustus*, elytris *mollibus*, ex bruneo & nigro varius.

*Scarabaeus rubeus*, elytris *mollibus* posterius tantum nigris.

*Scarabaeus angustus* ex nigro & cinereo lividus, elytris *mollibus* posterius macula lutea signatis, antennis longis saepius fractis, abdomine circulis luteis distincto, oculis protuberantibus.

*Scarabaeus parvus angustus atramentaceus* obscure virens, antennis granulatis, elytris *mollibus*.

*Scarabaeus angustus nigro virens & splendens*, elytris *mollibus*, antennis summitate clauatis.

*Scarabaeus niger* elytris nec *mollibus*, nec perfecte duris.

*Scarabaeus arboreus parvus angustus* elytris vt in coccinella vulgari ex nigro & rubro variis.

*Scar-*

*Scarabaeus niger* quous saepe elytro posterius dilute ex cinereo maculato.

*Scarabaeus maior* dumetorum nigro brunneus, tenuiter hirsutus, inferius auratus, antennis longis tenuibus instar herbae *Salicorniae* geniculatis.

*Scarabaeus parvus* glaber coeruleo viridis; pedibus & thorace bruneis, antennis nigris aequaliter granulatis, elytris porosis.

*Scarabaeus parvus* glaber brunneus, elytris subluteis maculis signatis, antennis clavatis.

*Scarabaeus niger* glaber minor, capite exiguo, dorso punctato.

*Scarabaeus domesticus* niger dimidio superiori elytrorum albo, antennis fissilibus.\*)

*Scarabaeus formicae* forma arboreus niger & bruneo variegatus.

*Scarabaeus* forma cylindri crassulus, corpore nigro, elytris rubentibus, maculis nigris signatis.

*Scarabaeus* e nigro subcoeruleus elateris forma, abdomine ad margines albo.

*Scarabaeus minor* forma coccinellae liliaceus e cinereo & nigro bruncoque varius, antennis ad sensum 2. tantum superius clauatis.

B 5

*Scar-*

---

\*) Vsum, quem Larna huius *Scarabaei* Anatomis praestare solet, elegantissime descripsit Celeberrimus HERBSTREITIVS Nov. Act. Erudit. Lips. A. 1742. p. 181.

*Scarabaeus* e bruneo niger parvus, antennis tenuissimis.

*Scarabaeus* magnus domesticus granariorum niger striatus. f)

*Idem* subrotundus latus capite paruo, antennis aequaliter geniculatis, niger.

*Scarabaeus* domesticus bruneus omnium minimus.

*Scarabaeus* domesticus exiguus granariorum bruneo niger, antennis granulatis longissimis.

*Idem* ex cinereo variegatus, elytris striatis & porosis.

B 5

*Scar-*

---

f) Si quis insigne illud miraculum Naturae & spectaculum omnia alia amoenitate superans suis oculis intueri cupit, quomodo ex *verme*, nullam similitudinem cum scarabaeo alente, *pupa* quaedam nitidissima, & ex hac, involucris aliquot depositis, *Scarabaeus* perfectus denique exoriatur, tantum opus habet aliquot e vermibus illis subluteis glabris hexapodibus in granariis ubique occurrentibus, qui Scarabaei huius nostri supra nominati *larvae* sunt, vitro, nonnullis granis tritici vel hordei adiectis, includere, & deinde usque ad evolutionem seu metamorphosin peractam alternis diebus examinare. Videntur mihi huius aliorumque insectorum evolutiones diligenter consideratae sententiam LOEWENHOECKII de hominis ex verine ortu si non propabilem reddere, saltem ab absurditatis culpa liberare, si nempe Recentiorum more cum Systemate Harnetiano combinetur.

*Scarabaens* fabarum incola niger incurvus, antennis clauatis, elytris brevioribus, qua concurrunt, linea brunea signatis, thorace punctato, abdomine prominulo incano, dimidio inferiore antennarum & pedibus anterioribus bruneis.

*Scarabaens* splendens & angustus oblongus, antennis longioribus.

*Scarabaens* dumetorum niger angustus, arcuatus, acuminatus, pedibus anterioribus & ore bruneis.

*Scarabaens* dumetorum pusillus coeruleus, antennis clauatis, capite & thorace fere quadrangulis.

*Scarabaens* coloris metallici e nigro virens, elytris duris ex miniato & coeruleo colore elegantissime variegatis, abdomine rubente imbricato in lamellas hiscente, antennis fissilibus & clauatis, vndique villosus, crurculis pedum posteriorum crassiusculis.

*Scarabaens* dumetorum niger subcylindricus, elytris granulatis & striatis, pedibus bruneis, antennis longioribus hinc inde fractis, articulo primo crassiore.

*Scarabaens* fuciformis perelegans niger, hirsutiae aurea vndique villosus, elytris glabris brevioribus, maculis e nigro & luteo virentibus transversim variegatis, antennis foliatis. g)

*Sca-*

---

g) Miranda est Naturae sollertia quae vni eidemque

*Scarabaeus* ex auro virens hirsutus, antennis clavatis foliosisque, membris mediis pedum spinosis.

*Scarabaeus* angustus niger quovis elytro duplici macula brunea signato, capite exili.

*Scarabaeus* abdomine crassiore nigro veluti quadrato, capite oblongo nigro, thorace angusto rubro, elytris porosis rubris & striatis, articulis pedum superioribus rubris, inferioribus nigris.

*Cassida* verticillatarum. L.

*Cassida* pertinacissima. L.

*Coccinella* vulgaris.

Coc-

---

que ideae in plurium rerum Naturalium productione saepe quidem constanter inhaeret, sed eandem tamen diversa modificatione in diversorum generum insectis exprimit, dum nobis inter *Scarabaeos*, *Scarabaeos* fuci & *vespaemuscae* formam referentes; inter *papilionis* itidem *papilionis* forma *mulcae*; inter *Muscas* vero, *Muscas* *apiforines*, *fuciformes*, *vespaeformes* & *papilionaceas* exhibet, quae bestiolae quod ad faciem externam attinet, sibi saepe sunt primo intuitu simillimae, propius examinatae vero genuinam *Scarabaei*, *Papilionis*, vel *Muscae* indolem exhibent. Nonne ex his quoque consequentia omni exceptione maiore, fuit, existere inter res Naturae perpetuam quamdam relationem, & esse ens quoddam supremum, quod omnia haec Divino suo intellectu comprehenderit, antequam illa secundum regulas Naturalis convenientiae ad existentiam perduxerit?

*Coccinella pallide rubens.* h)

*Coccinella elytris ex luteo & nigro variis.*

*Coccinella nigro brunea, elytris maculis rubris signatis.*

*Coccinella ex nigro splendide virens.*

*Coccinella maior sature virens, elytris rubris.*

*Coccinella vulgaris ex albo lutea, thorace & elytris eleganter colore nigro variegatis.*

*Coccinella oblonga, auro virens, splendida, cantharides colore aemulans.*

*Coccinella cyanea.*

*Coccinella exigua brunea.*

*Coccinella ex nigro & bruneo variegata.*

*Chrysomela elegantissima thorace & elytris rubra, reliquo corpore nigra, sonora, ex verme rubro folia lili albi depascente producta.*

*Eadem minor & pallidior, elytris punctatis.*

*Chrysomela asparagi nigra, thorace & elytris rubris, quatuor maculis albis & cruce mediana nigra pereleganter signatis.*

*Chrysomela alni melanocyanea.*

*Chrysomela glabra nigra, alis castanei coloris, glabris.*

*Cur-*

---

h) visu valde iucundum est aestate in hortis observare, quomodo vermes illi versicolores hexapodes, in arboribus vel dumetis antea algacriter discurrentes & folia depascentes, subito eis fixi inhaereant, corrugentur & globosi fiunt, & ex eis denique, exuviis relictis, nitida aliqua *Coccinella* prodeat.

*Curculio vulgaris granariorum.*

*Curculio dumetorum maximus porosus coeruleo viridis vel amoene cyaneus.*

*Curculio brassicanus parvus niger, pulvere gryseo vndique adpersus, striatus.*

*Curculio agrestis curculionis granariorum simillimus.*

*Curculio parvus niger, abdomine globoso, rostro acutissimo.*

*Cerambyx seu Capricornus magnus niger durus granulatus sonorus.*

*Cerambyx vespae colore hirsutus.*

*Cerambyx maior ex nigro & aurantio variegatus, hirsutiae brevissima, thorace utrinque aculeato, oculis tuberosis.*

*Capricornus atramentaceus, elytris mollibus.*

*Idem quous elytro cuspidato.*

*Capricornus ex cinereo & nigro varius.*

*Carabus s. Scarabaeus foetidus niger vulgaris.*

*Idem ex nigro & aurantio colore elegantissime variegatus, moschum redolens.*

*Mordella oleracea seu pulex plantarum vulgaris.*

*Mordella elytris luteis striis signatis.*

*Mordella thorace fuluo caetera splendide virens.*

*Mordella dilute brunea.*

*Cicindela corpore violaceo, elytris amoene viridibus, punctis aureis splendidissime ornatis.*

*Cicin-*



*Cicindela* obsolete virens, forficulis luteis.

*Cicindela* elytris mollibus, ex colore miniato aureo luteo & atro viridi elegantissime variegata, antennis granulatis.

*Buprestis* domestica cucullata, capite abscondito, subcinerea.

*Dytiscus* vulgaris seu Hydrocantharus.

*Gyrinus* aquaticus.

*Elater* vulgaris.

*Elater* ex nigro & cinereo variegatus maior.

*Elater* niger, elytris bruncis striatis.

*Elater* niger, thorace miniato.

*Cantharis* officinarum.

*Lampyrus* noctiluca.

*Blatta* foetida. i)

*Meloe* seu *Scarabaeus* vinctuosus. k)

*Auri-*

i) Natura mire ludit in huius *Scarabaei* formatione, modo enim occurrit elytris coadunatis, alis nullis, modo elytris liberis & alis perfectis, adeoque Character Linnaeanus de hoc *Scarabaeo* traditus non est vniuersalis. Vterque humorem mellisuum, ut *Meloe*, eructat.

k) Nota est praestantissima & certa huius, si tempestive & ante hydrophobiam ingruentem exhibeatur, *Scarabaei* in morlu canis rabidi cum lacte propinati virtus, cuius efficacia in sale quodam acri & caustico non minus ac cantharides michum cruentum, si in dosi excedatur, excitante consistit. Hinc illud *Berberianum* hic quoque obtinet, quod venena per alia aequae venena sed contrariae virtutis saepe curentur.

*Auricularia vulgaris.*

*Auricularia minor & nigra.*

*Staphylinus stercorarius splendens coeruleo niger.*

*Staphylinus non splendens minor, oculis protuberantibus.*

*Staphylinus ex nigro & rubro eleganter varius.*

*Idem ex albo & nigro varius.*

*Staphylinus minutissimus niger, cauda in aculeum simplicem terminata.*

*Staphylinus minutissimus niger, abdomine nullo aculeo vel vesicula praedito, antennis clauatis.*

*Staphylinus maximus ex nigro & obsoleto cinereo varius.*

*Curculio-pulex intra folia salicis nascens, niger, elytris striatis, pedibus bruneis. 1)*

*Gryllo-talpa.*

*Gryllus domesticus.*

*Gryllus filuestris niger subrotundus.*

*Gryllus agrestis maior viridis columbam recens ex ovo exclusam saepe aequans.*

*Locusta vulgaris.*

*Locusta saxatilis maior elytris maculatis.*

*Locusta aquatica minima.*

Ordo

---

1) Hic Scarabaeolus est quidem subentaneus foliorum salicis, & rostro instar aliorum curculionum praeditus, quia vero ad modum Mordellae vel pulicis salit, & simul cruribus pedum posteriorum crassiusculis donatur, peculiare genus constituit.

Ordo 2. HEMIPTERORVM ore sub  
thorace inflexo.

*Cicada* aquatica & vulgaris.

*Cicada* graminea femielytris maculatis humore salivali instar spumae per anum emissio se circumdans. m)

*Cicada* livido virens palustris.

*Cicada* ex viridi luteo & cinereo variegata minor.

*Cicada* exigua tota candida rosarum.

*Cimex* lectularius.

*Cimex bortenſis* e rotundo triangularis, longus, antennis fractis.

*Cimex magnus* scutiformis ex purpureo albus vel ferrugineus.

*Idem* atramentaceus.

*Idem* ex albo & nigro varius porosus.

*Idem* murini coloris paulo minor.

*Idem* ex albo & luteo variegatus.

*Idem niger* margine albus lectulario similis.

*Cimex* bruneo niger femielytris ex nigro bruneo & albo variis, antennis granulatis fractis.

*Cimex* minor atramentaceus.

C

*Cimex*

---

m) Haec est spuma illa, quam Hieracio potissimum herbae adhaerentem olim pro saliva Cuculi habuerunt.

*Cimex* niger splendens semieljtris ex bruno & nigro variis.

*Cimex* ex luteo viridi bruno & cinereo varius in dorso laminatus.

*Cimex* coccinellae forma ex luteo & nigro varius semieljtris perexiguus vel nullis.

*Cimex* virescens semieljtris corpore longioribus.

*Cimex* ex colore cinnabarino & nigro elegantissime variegatus antennis fractis typhaeformibus.

*Cimex* breuior niger punctatus saltans.

*Cimex* lectulario funilis niger splendens pedibus & antennis bruneis antennis fractis clauatis rudimentis semieljtrorum bruno cinereis.

*Cimex* maior viridis pedibus corpore longioribus antennis perlongis fractis, corpore punctato.

*Cimex* magnus cinereo argenteus striatus, acuminato capite, antennis fractis.

*Cimex* perangustus argenteus antennis longis fractis summitate tenuibus, oculis viridibus.

*Idem* forma vespa.

*Idem* bruneus corpore hispido.

*Cimex* forma muscae omnium maximus atramentaceus, oculis protuberantibus, antennis fractis.

*Tipula* aquatica.

*Notonecta* vulgaris.

*Eadem* prona minor.

*Hepa* seu *Scorpius palustris* L.

*Cimex aquaticus* L. seu *Scorpio palustris*  
corpore longissimo & angustissimo forma  
cimicis.

*Aphis Sambuci* L.

*Aphis brassicae* L. n)

*Aphis* antennis paulo breuioribus abdomi-  
ne haud cornuto.

## C 2

## Ordo

- 
- n) Hoc insectum cum brassica incaute commensum iure pro causa Dysenteriae aliorumque morborum malignorum habet illustris HOFFMANNVS Medicin. System. Tom. II. Cap. IX. §. XXV. Mireris tamen in rebus Physicis hunc alias solidissimum virum ibidem generationem aequiuocam dudum e scholis Physicorum eliminatam & explosam iterum in doctrinam Naturae introducere velle, dum vermiculos hos ab effluuiis sulphureis organicis seu animatis, vt vocat, produci credit, quum tamen tam certum sit quam quod certissimum, quod minimum insectum inde ab ortu huius Systematis mundani ad hunc usque diem per iraducem & succedaneam Parentum generationem eodem modo propagatum fuerit, quo maxime molis belluae, prout illud praeter alios ingeniosus VALLISNERIUS argumentis omni exceptione maioribus praesertim confirmavit.

Ordo 3. NEUROPTERORVM alis IV.  
venis reticulatis.

*Panorpa* seu *Scorpiurus* L.

*Raphidia* vespae formis longa, nigra abdominis medio rubro.

*Eadem* brunea.

*Chrysops* L.

*Musca* foetida L.

*Formica* - Leo L.

*Musca aestivalis* L.

*Ephemera* vulgaris

*Libellula* magna alis planis L. o)

*Libellula* magna alis erectis

*Libellula* media alis erectis subrotundis elegantissima.

*Libellula* parua alis erectis L.

Ordo 4. LEPIDOPTERORVM alis IV.  
squamulis imbricatis testis ore  
saepius spirali.

*Papi-*

- 
- o) In huius insecti oeconomia utique admirationem meretur, quod illius Larua ante euolutionem peractam animal amphibium & gressile sit, ita ut speciem ranae iunioris haud male referat, postea vero volatile fiat, quod aquae penitus immersum breui tempore certo certius perit.

*Papilio* antennis clauatis, pedibus 6. corpore niger alis maximam partem candidis seu Brassicanus.

*Papilio* alis inferioribus laceris ex bruno luteo & nigro elegantissime variegatus.

*Idem* luteus lineis transuersis nigris magnis vndique elegantissime striatus, parte alarum lacera maculis cyaneo-aurantiis pulchre variegatus.

*Papilio* corpore nigro bruno magnus, alis ex bruno & cinereo variegatis.

*Papilio* breuior crassulus ex nigro luteo & bruno variegatus.

*Idem* dimidio minor ex nigro cinereo bruno luteoque varius, oculis circumnatis.

*Papilio* bruneus pedibus anterioribus exilibus. p)

C 3

*Papi-*

---

p) Hic papilio primo intuitu non nisi 4. pedes habere videtur, 2. enim anteriores, qui exilissimi sunt, ita attrahit & inter plumas thoracis abscondit, ut non nisi magna cum industria perquisiti deprehendantur. Quumque insuper ex obseruatis illustrissimi REAUMURI quaelibet Eruca, quae Papilionis Larua est, minimum 6. pedibus genuinis, praeter spurios, instruat, & quibus Papilio eolutione sola ex eruca exoriens totidem partibus essentialibus quam illa necessario, ex eiusdem curiosissimi viri obseruatione, praeditus esse

*Papilio* ex bruneo luteo & nigro varius.

*Papilio* magnitudinis vulgaris pedibus 6. nigro bruneo albo croceo & cinereo colore instar caudae pauonis elegantissime maculatus, oculis valde tuberosis, maxillis magnis.

*Idem* amoene cyaneus.

*Idem* minor alis inferioribus rotundis luteis, superioribus albis.

*Idem* niger alis bruneis maculis signatis.

*Papilio* magnitudinis vulgaris e viridi luteus.

*Idem* elegantior e croceo bruneo nigro & viridi varius.

*Idem* alis ex croceo & bruneo tantum variegatis.

*Papilio* ex nigro cinereo albo bruneo sanguineo elegantissime variegatus, pedibus 2. anterioribus minoribus eleganter penniformibus, oculis tuberosissimis maxillis acutis erectis.

*Papilio* magnitudine & structura vulgari niger, alis & albo cinereo & obsoleto viridi variegatis.

*Idem* nigro-bruneus alis candidis maculis signatis.

*Papi-*

---

esse soleat, dubito, an papiliones 4. tantum pedibus instructi re vera existant, licet apud celeberrimum LINNAEVM aliquot eorum indicatos legam. Minimum mihi tales nondum occurrerunt, vtut ingentem papilionum numerum hucusque oculo & nudo & microscopio armato examinauerim.



*Papilio vulgaris* fere magnitudinis alis ex sanguineo & murino colore nunc in forma striarum, nunc macularum specie elegantissime variegatis, antennis modo clauatis modo filiformibus, oculis tuberosis Sclareae pratenfis alumnus.

*Papilio planus* & depressus ferotinus stridulus, ore intra hirsutiem recondito, antennis clauatis & eleganter crenatis, capite murino, corpore duro ex colore bruneo murino & albo vario, cauda lacerata, alis minoribus subrotundis.

*Papilio maximus* bruneo cinereus, alis albidis quasi sanguinolentis antennis aequaliter granulatis compactis.

*Papilio* magnitudine vulgari antennis leuiter & aequaliter articulatis, niger, alis bruneis, abdomine in 2. fibrillas terminato, ore nec maxillis nec spira instructo.

*Idem* atramentaceus.

*Idem* bruneus, alis maculatis, antennis longissimis, abdomine fibrillis carente.

*Phalaena antennis pectinatis* nigris perelegantibus, lingua nulla, corpore subbruneo alis albidis, lineis nigris ductu serpentino pulchre variegatis. \*)

C 4

Pha-

\*) Haec *Phalaena*, si alas striatas excipias, cum *Phalaena Bombycem* progenerante satis exacte conuenit & a SCHROEDERO in *Pharmacopoeia Medico-Chymica* p. m. 883. sub *Bombycis syluestris* nomine indicatur, qui &

*Eadem cinerea alis punctatis. q)*

*Phalaena Tithymalina. L.*

*Phalaena elegantissima vndique plumosa, maximam partem nivea, abdomine multata aurea hirsutis setosa. r)*

*Pha-*

---

& notatu dignam Observationem a Celsissimo & Sapientissimo quodam Scientiarum Patrono & Statore, cuius cineres & urnam adhuc Patria mea Butisbacum grata & venerabunda servat, circa metamorphosin eius factam describit; ubi sane curiosum, quod papilionum & Phalaenarum ex erucis vulgaribus evolutio, cuius inventionem alias praestantissimae *Merianae* & perspicacissimi *Schwamerdamii* observatis tribuunt, illis iam tum temporibus haud plane incognita fuerit.

- q) De Phalaenis in uniuersum caue, ne Scriptoribus nonnullis Historiae naturalis credas, eas papiliones tantum nocturnos esse, plurimae enim earum inter diu quoque volant.
- r) Haec elegans de reliquo Phalaena erucarum gregariarum arborearum genetrix fere praecipua est, quae arboribus frugiferis Germaniae maximam saepe pestem inferre solet, dum noctu volans eis ouula sua, nemine observante, adnectit, quae in erucas excrescentia integras saepe provincias devastant ac spem incolarum paucorum dierum spatio perdunt, folia cum floribus arborum citissime absumendo. Prout Phalaenarum ordo per se frugibus & herbis perniciosior quam Papilionum existit, licet plures earum ore & reliquis organis masticatoriis careant, adeoque inedia breui moriantur, quum e contraria parte laruae earum seu erucae eo voraciores sint.

*Phalaena* ex fusco alba abdomine in 2. filamenta incurua terminato.

*Phalaena* puluerulenta minor lutescens cauda pilosa, maxillis longis acutis, ore spirali.

*Phalaena* crassula cinereo brunea, alis maculatis, *antennis tenuibus longis granulatis & subulatis.*

*Phalaena* subcinerea alis corpore duplo longioribus.

*Phalaena* alis planis ex cinereo & albo varia.

*Eadem* ex luteo & bruneo variegata.

*Eadem* alis viridibus.

*Eadem* ex albo lutea alis maculatis.

*Eadem* argentea margine alarum nigro.

*Eadem* brunea.

*Eadem* ex colore aurantio & bruneo varia.

*Eadem* argenteo-cinerea variegata.

*Eadem* alis posterius laceris.

*Eadem* puluerulenta albida ex paucis cinereo colore hinc inde varia.

*Eadem* ex nigro & argenteo varia.

*Eadem* parva glabra albicans alis angulatis.

*Eadem* corpore nigricante circulis argenteis distincto alis variegatis non angulatis.

*Eadem* argentea longissima & angustissima.

*Eadem* alis corpori appressis albida punctata.

*Eadem* alis nigricantibus lineis cyaneis variegata.

*Eadem* alis planis argenteis laceris, anterioribus breuibus, maxillis praelongis.

*Eadem* vespae forma.

*Eadem* antennis praelongis cauda foliosa.

*Eadem* paulo maior obsolete candida maxillis modo longis modo ordinariis.

*Eadem* maxillarum barbis nigris, alis ex bruno rubro & cinereo variis.

*Eadem* ex albo cinerea fusco & luteo varia, corpore simplici.

*Eadem* exigua domestica abdomine spinato.

*Eadem* exigua nigricans aurata, maxillis acutis reflexis.

*Eadem* muscae formis pusilla nigra, pedibus variegatis, alis planis posterius laceris.

*Eadem* exigua lanificiorum. *Reaumurii*.

*Eadem* apiariorum. *Reaumurii*.

*Eadem* dumerorum e nigro liuido argentea, antennis tota bestiola longioribus.

*Eadem* atramentacea antennis breuibus.

*Eadem* obsolete brunea alis posterius albis stercus auicularum referens.

*Eadem* alis planis argenteo varia.

*Eadem* exigua murini coloris.

*Phalaena* albouirefcens corpore crassiusculo antennis tenuibus granulatis. s)

Ordo

---

s) Larua huius *Phalaenae* integrotum saepe *Quercetorum* folia & fructus tenellos depalcat.

Ordo 5. HYMENOPTERORVM alis

IV. membranaceis.

*Cynips* abdomine & thorace luteo, capite nigro.

*Cynips* nigra ore abdomine & pedibus vespaee forma alis maculatis.

*Cynips* nigra ex bruneo varia.

*Cynips* nigra thorace in dorso & lateribus rubro luteo.

*Cynips* capite & thorace nigra reliqua lutea, pedibus variis.

*Cynips* atramentacea.

*Cynips* exigua formicae forma splendens, abdomine acuminato antennis clauatis.

*Galla quercina* L.

*Rosa Salicina* L.

*Hieracium Myophorum*. L.

*Ichneumon* niger corpore longo angusto.

*Ichneumon* maior abdomine rubro luteo antennarum medio candido.

*Ichneumon* dimidio antennarum & pedum albo.

*Ichneumon* abdomine & articulis mediis pedum bruneis.

*Ichneumon* minor ex nigro & rubro circumnato varius, pedibus posterioribus inferioribus globosis & crassis deinde vero per tenuibus quinque articularibus.

*Ichneu-*

*Ichneumon* parvus *Aphidum*.\*)

*Ichneumon* gallae cynosbati pedibus inferius albis.

*Ichneumon* gallae cynosbati ex viridi elegantissime fulvus seu *Musca* auro relucens & versicolor MENZELII in Observat. Curios. Natur. Anni II. Decad. II. Obs. 10. descripta.

*Vespa-ichneumon* luteus abdomine inferius nigro.

*Idem* versicolor niger innumeris modis colore varians.

*Crabro* L.

*Vespa* vulgaris.

*Vespa crabroniformis*.

*Vespa* minor hortensis maximam partem nigra, abdomine angusto & nodoso.

*Vespa* campestris & subterranea ex atramentaceo & rubro colore varia.

*Vespa* brunea corpore longissimo.

*Vespa* exigua ex nigro bruneoque colore variegata apiformis antennis clauatis.

*Vespa*

---

\*) *Ichneumonum* utilissimi insectorum *Chrysalides* erucarum & *Aphides* curiosa sane, ut REAUMURIUS primus adnotavit, semini sui in corpora illorum inunitione perimentium generis semper insignem illis annis penuriam deprehendi, quibus e contrario papilionum & *Aphidum* gens maxime numerosa vigeat & totas provincias devastabat.

*Vespa* exigua pedibus superius crassiusculis,  
antennis breuib. alis maculatis.

*Apis* gregaria. t)

*Apis* solitaria dumetorum versicolor.

*Apis* ex coeruleo & viridi elegantissime ful-  
ua, seu *Apis* aurata L.

*Eadem* tota coerulea virens.

*Bombylius* niger.

*Bombylius* lutescens.

*Bombylius* ex fusco & luteo incanus.

*Bombylius* minor striatus.

*Formica* hippomyrmex. L.

*Formica* vulgaris & minor brunea. \*)

For-

t) Si quis de veritate thescos a RORARIO du-  
dum indicatae, quod in actionibus plurium  
animalium aliquid rationi humanae analogum  
obseruetur, plene convinci cupit, SCHWA-  
MERDAMIUM & REAUMVRIUM de api-  
bus ut legat, tantum opus habet.

\* Circa sexum formicarum sententiae Auctorum  
valde diversae occurrunt, B. FRISCHIO omnes  
alatae mares dicuntur, illustr. REAUMVRIO  
vero alatae etiam diversis sexus esse statuuntur,  
cui cel. LINNAEVS in ultima Systematis Na-  
turae sui editione denique adstipulatur. Me  
quod spectat, observatio Reaumuriana, quae  
etiam in aliis insectorum speciebus hucusque  
a me nunquam falsa deprehensa fuit, mihi  
eo magis cum Natura rei convenire videtur,  
quo frequentius mihi inter examina eiusmodi  
formicarum alatarum initio aestatis aerem  
peruagantium tota paria earum sibi cohae-  
rentia deprehensa fuerunt.

*Formica citrina.*

*Formica paullo maior nigra.*

*Formica rotundior & breuior nigro-bru-  
nea.*

Ordo 6. DIPTERORVM stilo capitato  
sub singulis alis, alis  
duabus.

*Oestrum bouinum* L.

*Afilus tibiarius* L.

*Hippoboscus virescens* alis papilionaceis.

*Tabanus vulgaris* L.

*Musca domestica* L.

*Vermiculus casei* L.

*Musca stercoraria.*

*Musca aurata* carnaria fetosa.

*Musca arborum* angustior nigra, stilis capi-  
tatis lucidis albis.

*Musca dumetorum*, mare nigro, abdomi-  
ne bifariam obtuse acuminato, femella  
ex nigro & rubro variegata.

*Musca apiformis* nigra metallici coloris varia.

*Musca apiformis* hirsuta abdomine trifari-  
am obtuse diuiso.

*Musca parua* argentea alis corpore maio-  
ribus obliquis variegatis seu papiliona-  
ceis.

*Musca parua* alis excipere & nigro elegan-  
ter papilionaceis.

*Musca*



- Musca angusta longa, domestica maior, pedibus ex peculiaribus cruscis orientibus, alis fibrosis, ex nigro & bruneo varia, oculis viridibus, abdomine subulato, ore aculeo instar Tabani praedito.*
- Musca brunea alis non fibrosis pedibus ore & abdomine muscae domesticae similis.*
- Musca nigra maior vespae figura, stilis citrinis.*
- Musca cadauerum variegata, setosa, pedibus soleis instructis, stilis absconditis.*
- Musca cadauerum variegata setosa pedibus soleis instructis Tabani magnitudine.*
- Musca glabra oculis bruneis, abdomine subrotundo nigro vel variegato.*
- Eadem longior hortensis ex viridi metallici coloris abdomine coerulescente, oculis tuberosis linea viridi distinctis.*
- Musca domestica paulo minor nigra, oculis rubro bruneis, alis maculatis.*
- Musca parua gregaria fimetorum.*
- Musca palustris domestica angustior e colore metallico virens alis posterioribus macula nigra & albida signatis.*
- Eadem alis non maculatis, oculis maxime protuberantibus, antennis breuibus papillaribus & simul filamentosis.*
- Musca apiformis thorace striato oculis punctatis.*
- Musca forma fuci hirsuta nigra canescens intra cutem bouum progenita.*
- Eadem forma fuci bruneo nigra sericea rotata.*
- Musca*

*Musca* forma apis minor, abdomine vt in vespis variegato.

*Musca* exigua atramentacea, capite paruo, corpore & antennis longioribus, abdomine saepe rubente.

*Musca* magnitudine vulgari ex luteo & bruneo variegata, rostro subulato sursum verso, maxillis aequae longis intermedio.

*Musca* solitaria nigra medio depressa, alis nigricantibus, *antennis* ad sensum *nullis* capite setoso.

*Musca* aquatica domesticae similis.

*Musca maxima crabronis* forma, hispida, ex nigro fusco lutea, *alis papilionaceis*.

*Musca* magna abdomine longiore ex nigro & griseo circumato varia, puluerulenta hispida, *oestro bouino* similis.

*Musca* nigra hirsutiae brunea.

*Musca* crassa setosa, ex nigro alba lutescens pedibus variegatis, oculis tuberosis, rostro bruneo, *abdomine papillari*.

*Musca* serotina angusta thorace longiore *antennis* summitate *clauatis*, totidem filamenta emittentibus.

*Musca* serotina setosa bruneo cinerea abdomine circumato posterius in maribus papillari, *antennis* fere *nullis*, alis punctatis.

*Musca* pisorum incola. v)

*Musca*

---

v) Haec musca vim deleteriam possidet ita vt illi, qui talibus pisce vescuntur, subito saepe aegro-

*Musca parua rubens cellarum.*

*Musca domestica paulo minor nigra pedibus posterioribus vt in gryllis saltatoriis & magnis.*

*Musca gregaria cimiciformis abdomine aurantio, thorace rubro, reliquis partibus nigris.*

*Musca minor capite paruo globoso, rostro oris cimiciformi, abdomine in spinam abeunte, nigra.*

*Musca crassa brevis oculis rubris, alis vt in oestro bouino variegatis, abdomine crasso, antennis capillaribus exilibus.*

## D

## Mu-

---

grotantes morti occumbant, prout mihi eiusmodi exempla nota sunt. In vniuersum nullus insectorum ordo est, qui minus ad materiam Medicam conferat, quam familia muscarum, quae potius in hominibus aequae ac in brutis diuersorum morborum causa est, prout v. gr. praestantissimus REAUMURIUS ab examinibus patiarum muscarum vix nisi microscopio conspiciuarum aërem saepe peruagantium & cum cibo & potu ab hominibus deglutitarum interdum constitutiones epidemicas morbosas produci obseruauit. Interea autopsia docet, in nullius fere insectorum generis structura maiorem Naturae lusum ac mirabiliorem varietatem, quam in muscis occurrere.

*Musca longa angusta atramentacea hirsuta, oculis bruneis, stilis nigris, alis nigricantibus.*

*Musca magna nigra Tabanum vndique aemulans, aculeo nullo, lingua prominente, maxillis albidis superius tuberculosis.*

*Musca nigra apiformis pedibus & ore luteis, corpore instar vespae ex nigro & luteo variegato, alis ad marginem bruneis.*

*Musca domesticae similis atramentacea setosa, alis punctatis, oculis rubris, stilis citrinis.*

*Musca plana, magna, fere fuci formam referens capite & thoracae ex bruneo & luteo variegatis, abdomine cinereo crassissimo papillari, pedibus vt in scarabaeis formatis, vaccarum. x)*

*Musca parua gregaria stercoraria equina.*

*Musca variegata abdomine gracili, pedibus posterioribus vt in locustis formatis, ore cauernoso albo, antennis muscae domesticae.*

*Mu-*

---

x) Oua huius insecti, quorum vix vnum & alterum excludit, quum reliquarum muscarum qua sint innumera, cecyophyllos aromaticos ex obseruatione *Reaumuriana* ab experientia confirmata exacte referunt.

*Musca* antennis fibrosis paulo longioribus, pedibus structurae ordinariae, lingua rostrata.

*Musca* atramentacea abdomine ex citrino & nigro vario, *culiciformis* cynosbati.

*Musca* acetiparua nigra, *antennis granulatis*, abdomine fibroso.

*Musca* paulo maior aquatica argentea, cruculis pedum anteriorum crassissimis.

*Musca* campestris domesticae similis.

*Musca* subrotunda parua ex nigro & citrino variegata, oculis aureis, gregaria.

*Culex* vulgaris. L. \*)

*Culex* antennis plumosis.

*Tipula* maxima alis papilionaceis.

*Tipula* paulo minor cinerea ex luteo & nigro eleganter variegata.

*Tipula* bruneo nigra, alis ad medium punctis signatis.

*Tipula* parua ferotina gregaria culiciformis. L.

## Ordo 7. APTERORVM alis nullis.

*Pediculus* humanus.

D 2

*Idem*

---

\*) De Culice eruditam tractationem edidit Joh. Matthias BARTHIVS.

- Idem* inguinalis.  
*Idem* suillus.  
*Idem* anserinus.  
*Idem* gallinae.  
*Idem* librorum celerrime currens.  
*Pulex* vulgaris.  
*Pulex* aquaticus *Schwamerdamii*.  
*Podura* aquatica L.  
*Monoculus* apus L.  
*Concha* pedata L.  
*Araneus* longipes.  
*Scorpio* araneus.  
*Ricinus* L.  
*Araneus* coccineus.  
*Pediculus* *Scarabaei* L.  
*Aranea* maxima L.  
*Aranea* vulgaris L.  
*Aranea* faccifera L.  
*Aranea* aquatica L.  
*Cancer*.  
*Millepes*.  
*Asellus* aquaticus.  
*Scolopendra* terrestris.  
*Scolopendra* maior brunea.  
*Julus* pedibus vtrunque 80. ad 90.

*Insectum* subterraneum vernacula Vhlwurm  
dictum y)

CLASSIS IV.  
DE  
VERMIBVS.

Ordo I. REPTILIVM corpore nudo  
artubus destituto.

*Gordius* seu Seta aquatica L.

*Ascarides* limosae rubrae L.

*Eaedem* animales L.

*Lumbricus* terrestris L.

*Lumbricus* teres L.

*Lumbricus* latus Tulpii & L.

D 3

Ver.

---

y) a CELLINAE O haud descriptus per Germani-  
am vero vulgatissimus hic vermis peculiare  
genus constituit, ob 2. oris forficulas insignes,  
quibus radicibus tenellis plantarum oleracea-  
rum praesertim insigne detrimentum infert,  
& pedes 4. nodosos, quibus tamen haud re-  
cta progredi valet, sed ad latus inclinatus tan-  
tum prorepat, nec ullam unquam Metamor-  
phosin subit, & talpa coecior est.

*Vermis Cucurbitinus* L.

*Hirudo*. \*)

Ordo 2. ZOOPHYTORVM cor-  
pore nudo artubus in-  
struēto.

*Limax* vulgaris ruber hortensis

*Limax* agrestis minor cinereus.

*Limax* parvus arboreus brunneus niger.

Ordo 3. TESTACEORVM tegmine  
corporis testa lapidea.

*Cochlea* hortensis magnitudinis & coloris  
diversae.

*Cochlea* turbinata aquatica.

*Tutus* vermicularis L.

*Concha* vulgaris fluviatilis.

*Concha*

---

\*) *Hirudo* iniur cum potu Aquae incaute hausta  
ex nostra quoque observatione vomitum cru-  
entum & cardialgiam nonnunquam lethalem  
excitavit, praecipue si Medicus causam huius  
mali ignorans convenientem Medelam, quae  
in aquae falsae copiosa propinatione potissi-  
mum quaerenda est, adhibere nequeat.



*Concha minima lacustris variegata gregaria. 2)*

2) Insecta aquatica sunt ea, quae in motu membrorum suorum & totius corporis pulcherrimum sane mechanisimum nobis spectaculo offerunt. Comprobant illud praeter hanc conchulam nitidissimam vix senem cannabis mole aequantem *Tubus vermicularis* L. *concha pedata* L. *Monoculus apus* L. *Tipula aquatica* L. *Cicada aquatica* L. *Notonecta* L. *Gyrinus aquaticus* L. & *Hydrocantharus*, quorum actiones nemo propius suae admiratione intueri potest. Interea eadem sanitati humanae plurimum damni quoque inferunt, aquam ouulis & foetura sua inquinantia & funesta saepe symptomata in bibentium corpore excitantia, cui quidem labi aquae ante potum decoctio omnium optime medetur. Minus hinc a vero aberrant, qui Fungos & Muscos ex regno vegetabili, & insecta ex animali inter se conferunt & plerorumque illorum intuitu hominis vsum magis Philosophicum quam Medicum esse statuunt, cum omnibus illis aliquid caustici & venenati inesse comperiatur. Denique ratione conchulae huius supra indicatae adhuc monendum restat, quod celebre illud petrificatum *Moguntinum*, quod instar lapidis magnae saepe molis ibi eruitur, & cuius nonnulla exemplaria in montibus *Wetteraviae* quoque hinc inde occurrunt, fere totum ex hac conchula praecipue vero ex cochlea aquatica *turbinata* pagina praecedente recensita conflatum sit, adeoque non tam pro concreto extraneo & marino,

no, quam pro indigeno haberi queat, & hinc ad inundationem quandam particularem huius Prouinciæ tantum comprobendam sufficiat. Dantur vero alia petrefacta marina vera, v. gr. lapis Viennensis ab immortalī SCHEVCHZERO in Commentariis Instituti Scientiarum Bononiensis descriptus, quæ indubitata vestigia & rudera inundationis cuiusdam vniuersalis mundi aliquando factæ nobis ob oculos ponunt.

---

Pag. 13. lin. vltim. lege crispis.

Pag. 26. lin. 30. lege probabilem.





